

注意！！

クビアカツヤカミキリ

見つけたら大至急ご連絡を！！

- 本種は本県未確認（**隣県での発生あり**）の**特定外来生物**で、果樹類やサクラでの被害が懸念されています！



成虫



被害の様子



排出されたかりんとう状のフラス

(写真提供 福島県農業総合センター果樹研究所)

<特徴>

- 成虫は22～38mmで**胸部が鮮やかな赤色**、頭部・腹部は黒色でツヤがある。
- 幼虫は樹の中で2～3年過ごし、成虫は6月～8月にかけて発生する。
- モモの大害虫**で発生地では**壊滅的な被害**が発生している。他にウメ、スモモ、オウトウ、サクラなども加害する。
- 樹体内部を食い荒らし、**大量のフラス**（木くずと糞が混じったもの）を排出する。フラスの特徴は**かりんとう状**である。

| 確認年 | 確認地域（13都府県） |
|-------|-----------------|
| 2012年 | 愛知県 |
| 2013年 | 埼玉県 |
| 2015年 | 群馬県、東京都、大阪府、徳島県 |
| 2016年 | 栃木県 |
| 2017年 | 和歌山県 |
| 2019年 | 奈良県、茨城県*、三重県* |
| 2021年 | 神奈川県* |
| 2022年 | 兵庫県* |

(2023年3月現在、*は農作物被害がないため特殊報発表なし)

★クビアカツヤカミキリを見つけた場合や発生が疑われる場合は、最寄りの農林事務所農業振興普及部・農業普及所または農業総合センター安全農業推進部発生予察課（病害虫防除所）（024-958-1709）までご連絡ください。